

Tricholine jardin

La solution efficace pour lutter naturellement contre les chenilles défoliatrices du potager et du jardin (aussi utilisable sur balcons).



QUELLES PLANTES JE PROTÈGE ?

- Cultures maraîchères
- Cultures potagères
- Massifs fleuris
- Plantes ornementales



QUELS RAVAGEURS JE CONTRÔLE ?

- Chenilles polyphages et défoliatrices
- Piérides du chou et de la rave
- Noctuelles
- Pyrales du maïs



Je suis un trichogramme, un auxiliaire du jardin parasitoïde de la famille des hyménoptères. Je pond mes oeufs dans ceux des ravageurs et de nouveaux trichogrammes sortent de ces oeufs à la place des chenilles.

Tricholine jardin

Je vais pondre dans les œufs de la Pyrale du buis et injecter une substance qui contribuera à parasiter le contenu de l'œuf du ravageur, cette décomposition servira d'aliment à ma progéniture qui va se développer à son intérieur. Vous remarquerez mon action en voyant que les œufs de la Pyrale du buis à l'origine blancs deviennent noirs.

- Les trichogrammes parasitent les œufs pondus par les papillons et qui donnent ensuite des chenilles
- Consommation quotidienne élevée de proies
- Réduction rapide des nuisibles
- L'utilisation des diffuseurs et donc la circulation des trichogrammes dans votre jardin est compatible avec les larvicides biologiques à base de *Bacillus thuringiensis*

A quelle période de l'année suis-je active ?



Pendant la période de croissance des végétaux, ou dès l'apparition des premiers papillons.

Quelle quantité vous faut-il ?

Je suis livré dans une boîte qui contient 4 diffuseurs.

Chaque diffuseur permet de protéger environ 100m² pendant une semaine. Une boîte vous apportera donc 1 mois de protection pour un jardin de 100m² ou 2 semaines de protection pour un jardin de 200m².

Quelques conseils pour une efficacité optimale :

- Les premiers vols de papillons doivent être détectés avant mon lâcher.
Pour cela, utiliser un [piège Entonnoir](#) ou un [piège Delta®](#) avec la phéromone correspondante (voir liste des phéromones disponibles sur notre catalogue).
- Nous nous activerons environ 10 jours après la pose des diffuseurs à une température moyenne de 20° C. Il conviendra de sortir du réfrigérateur un diffuseur chaque semaine et pendant 4 semaines de suite.
- Accrocher le diffuseur au milieu de la zone (100 m² maximum) à protéger, dans le feuillage des plants à l'abri du soleil et à + de 50 cm du sol.